

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для застосування  
добавка дієтична  
сорбційно - детоксикаційної дії

**Висновок державної санітарно-  
епідеміологічної експертизи**  
№602-123-20-2/6299 від 21.02.2018 р.

**"ПОЛИСОРБ ФОРТЕ"**  
(POLISORBUM)

**Склад:** кремнію діоксид колоїдний.

*діюча речовина:* Silicii dioxydum colloidalе.

**Форма препарату.** Порошок для приготування суспензії для перорального застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* пухкий порошок білого кольору без смаку без запаху.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакологічна дія.* Сорбційна та детоксикаційна.

*Фармакодинаміка.* Добавка має високу сорбційну здатність стосовно ендogenous і екзогенних токсинів, ферментів, продуктів розпаду речовин білкової природи, мікроорганізмів, харчових алергенів, лікарських препаратів; сприяє виведенню токсичних речовин з організму, зниження симптомів інтоксикації, в тому числі алкогольної.

*Фармакокінетика.* Добавка не розщеплюється і не всмоктується в шлунково-кишковому тракті і виділяється в незмінному вигляді.

**Рекомендації щодо застосування.** Рекомендується вживати в раціонах дієтичного харчування з метою підтримки нормальних та відновлення порушених функцій організму, які спричинені інтоксикацією різного генезу.

**Протипоказання.** Індивідуальна несприйнятливості продукту; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення; виразки та ерозії слизових оболонок тонкого і товстого відділів кишечника; непрохідність кишківника.

**Спосіб застосування та дози.** Добавку "Полисорб ФОРТЕ" приймають тільки у вигляді водної суспензії для внутрішнього вживання; для отримання суспензії необхідну кількість добавки ретельно розмішують в 100 — 200 мл води; суспензію приймають всередину за 1 год до прийому їжі або прийому лікарських засобів; оптимальна норма на добу для дітей від 1 року до 7 років становить 150 мг на 1 кг маси тіла; оптимальна норма на добу для дорослих і дітей старше 7 років становить 200 мг на 1 кг маси тіла; добову норму розподіляють на 2 - 4 прийоми протягом доби; максимальна разова доза добавки не повинна перевищувати половини добової норми; максимальна добова норма для дорослих становить 300 мг на 1 кг маси тіла але не більше 25г.

*Рекомендації щодо приготування суспензії.*

Маса тіла	Доза порошку для приготування суспензії на одноразовий прийом	Кількість прийомів на добу
11-20 кг	1 чайна ложка сухого порошку без гіркі (+ 50 мл води)	2 прийоми на добу
21-40 кг	1 чайна ложка сухого порошку з гіркою (+ 100 мл води)	2 прийоми на добу
45-60 кг	1 столова ложка сухого порошку з гіркою (+ 150 мл води)	3 прийоми на добу
65-90 кг	2 столові ложки сухого порошку з гіркою (+ 200 мл води)	3 прийоми на добу

- одна чайна ложка з гіркою містить 1,5 грам сухого порошку Полисорб ФОРТЕ.
- одна столова ложка з гіркою містить 3,0 грам сухого порошку Полисорб ФОРТЕ.

**Рекомендації щодо застосування у випадках.**

*Очищення організму від токсинів.* Добова норма становить 100 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна добова норма 9 г. Добову норму прийняти за 2 - 3 прийоми. Курс протягом 10 - 12 днів. Курс очищення слід проводити не частіше 1 разу на півроку.

*Розлади з боку шлунково-кишкового тракту, пероральні отруєння.* Обмежити споживання їжі, доцільно починати прийом з половини добової норми. Добова норма становить 200 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна добова норма 18 г. Добову норму потрібно прийняти за 3 - 4 прийоми. Курс протягом 3 - 5 днів.

*Алкогольна інтоксикація.* Після прийняття алкоголю прийом разової дози у кількості 100 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна разова доза 6 г. Добова норма на другу добу становить 200 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна добова норма 18 г. Добову норму потрібно прийняти за 3 - 4 прийоми.

**Харчова (поживна) цінність 100 г продукту, г:** жири - 0, білки - 0, вуглеводи - 0

**Енергетична цінність (калорійність), ккал/100 г:** 0

**Застереження при застосуванні.** Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Використовувати продукцію тільки за призначенням.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Забороняється вживання сухого порошку. Прийом тільки у вигляді суспензії.

**Застосування в період вагітності або годування груддю.** Під час вагітності або годування груддю застосування добавки не рекомендується.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Добавку не вживати дітям у віці до 1 року.

**Побічна дія.** У поодиноких випадках можливий запор.

**Передозування.** У випадках прийому більш високих доз добавки будь-які ознаки передозування не спостерігаються.

**Термін придатності.** 36 місяців з дати виготовлення.

**Умови зберігання.** В упаковці виробника, в сухому та чистому місці, при температурі від 0 С до +25 С та відносній вологості повітря не більше 80 %. Зберігати у недоступному для дітей місці. Готову суспензію зберігати у щільно закритому флаконі при температурі від 8 до +15С не більше 32 годин.

**Упаковка.** По 25 г порошку у пластикових банках, по 9 банок в пачці з картону. По 3 г порошку у пластикових флаконах, по 4 флакону в пачці з картону.

**Кінцева дата споживання «Вжити до», номер партії (серії) виробництва.** Див. на упаковці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта. Не є лікарським засобом.

**Замовник.** ТОВ "МТЛ", Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятина 7, тел.: +380506354503, email: metrotrade@metrotade.com

**Адреса потужностей виробника (об'єкта).** Україна, 10025, м. Житомир, вул. Промислова 9.